

刺瘡篇第三十六

足の六經脈に
瘡の分類

陽明之瘡

人身體解

熱多汗出甚

刺足少陽

足陽明之瘡

令人先寒

酒淅

寒甚又及熱

熱去汗出

喜見日月光

足太陽之瘡令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱

熇熇然熱止汗出難已刺却中出血足少陽之瘡令

人身體解寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然

熱多汗出甚刺足少陽足陽明之瘡令人先寒酒淅

寒甚又及熱熱去汗出喜見日月光人及快然

刺足陽明跗上足太陰之瘡令人不樂好太息不嗜食

多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已及衰即取之足少陰之

瘡令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處

其病難已足厥陰之瘡令人腰痛少腹滿小便不利

其病難已足厥陰之瘡令人腰痛少腹滿小便不利

二
ういえる

二

五蔵による
瘧の類

胃+

楊子云
青黄

青黄
青黄

青黄
青黄

完
完

完
完

完
完

フ
フ

如瘧狀、非瘧也。數便、意恐懼、氣不足、腹中悒悒、刺足

厥陰

心瘧
心瘧

肝瘧者、令人心寒、寒甚、熱熱、開善、故為如有所見者、

刺手太陰、陽明、心瘧者、令人煩心、甚欲得清水、反寒、故

不甚熱、刺手少陰、肝瘧者、令人色蒼蒼然、太息、其狀

若死者、刺足厥陰、見血、脾瘧者、令人寒、腹中痛、熱則

腸中鳴、鳴已、汗出、刺足太陰、腎瘧者、令人洒洒然、腰脊

痛、宛轉、大便難、目眴眴然、手足寒、刺足太陽、少陰

胃瘧者、令人且病也、無飢而不能食、食而支滿、腹大、刺

足陽明、太陰、橫脈、出血

楊子云

楊子云

瘧病、內熱、病

異消瘴

廣韻、許縣、切、目動

〔鄧〕靈衛後は、少陰、廉泉は、
 人迎の脈の脈なり。初脈則にあり。一と云ふ本と云ふ。
 〔金冰〕任脈の
 廉泉と云ふは、
 足少陰の脈なり。一と云ふ本と云ふ。
 〔金冰〕任脈の
 廉泉と云ふは、
 足少陰の脈なり。一と云ふ本と云ふ。

リヤ中

注大注入

〔V〕

〔鄧〕
 足陰陽

〔VI〕

先其發時、如食頃而刺之一刺則衰、二刺則知、三刺則已。不已刺舌下兩脈出血。不已刺郄中盛經出血。

又刺項已下俠脊者、已。主下兩脈者、廉泉也。

刺瘡者、先問其病之所先發者、先刺之。先頭痛、及

重者、先刺頭上、及兩額兩眉間出血。先項背痛者、

先刺之。先腰痛者、先刺郄中出血。先手臂痛者、先

刺手少陰陽明十指間。先足脛痠痛者、先刺足

陽明十指間出血。

風塵瘡發、則汗出惡風、刺三陽經背俞之血者、斷後

痛甚、病之不可名曰附髓病。以鑱鍼鍼絕骨出血立已。

〔新校正〕手陰陽十指間 同大素

作^ハ瘧^ハ
作^ハ瘧^ハ

身體小痛刺至陰^{スルハ}諸陰之井氣出血^ス間日一刺瘧不渴^セ
開日而作刺足太陽^{ルハ}為而間日作刺足少陽^{ルハ}溫瘧汗^セ
不出為五十九刺^ハ

素問評虛實篇——諸病の起る方の総括