

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

全五卷、マナリヤ、原史病、回春書原、

瘧論篇第三十五

黃帝問曰、夫瘧瘧皆生於風。其蓄作有時者何也。

岐伯對曰、瘧之始發也、先起於毫毛、伸欠及作寒慄

鼓顙、腰脊俱痛。寒去則內外皆熱、頭痛如破、渴欲

冷飲。帝曰、何氣使然、願聞其道。岐伯陰陽上下交爭

虛實更作陰陽相移也。陽并於陰則陰實而陽虛

陽明虛則寒慄鼓顙也。巨陽虛則腰脊頭痛。

三陽俱虛則陰氣勝、陰氣勝則骨寒而痛。寒在於

內攻中外皆寒。陽盛外熱、陰虛則內熱、外內皆熱則

喘渴。故欲冷飲也。

上下正常



內外正常



作、マナリヤ、

瘧瘧之起、風邪、寒慄、腰脊痛、陽并於陰、陰實陽虛、陽盛外熱、陽虛外寒、

衛氣一皮の下、経脈の外を廻る。

營氣一皮の中、経脈の中を廻る。

同大の靈・氣・血・脈により。

二、瘧の邪は、衛氣と争ひに廻る。

夏の日

二、二、二

夏の暑に傷み

【工】

此皆得之夏。傷於暑。熱氣盛。藏於皮膚之内。腸胃

金元
大用之、病邪、
汗出、経路、

之外。此榮氣之所舍也。此令人手足空疏。腠理開。因得

秋氣。汗出。遇風。及得之以浴。水氣舍於皮膚之内。

與衛氣并居。衛氣者。晝日行於陽。夜行於陰。

此氣得陽而外出。得陰而內薄。內外相薄。是以日作。

【II】
發作の一、月
おきに作る理由

帝曰。其間日而作者。何也。岐伯曰。其氣之舍深。內薄於陰。

陽氣獨發。陰邪內著。陰與陽爭。不得出。是以間日

而作也。

【III】

發作の日の
厚に起る者
早く起る者
あるは何故か

帝曰。善。其作日晏。與其日早者。何氣使然。岐伯曰。邪氣

客於風府。循脊而下。衛氣一日一夜大會於風府。

脊一脊脊隙の肉の脊骨

腎骨
一伏脊筋
= 脊中?
= 脊筋?
+9=35日 天突

衛氣は二晝夜とに風府に廻る。その時に腰理の間に
邪が入る。邪は一日毎に頸椎の腰椎の
一つづつ下へ下へとして。衛氣の風府に來る時、ここに邪の
あはれは作あきる。

四日、邪、つりり
清江、30日

7
12
5
C
L
L

24日
25日
26日

其明日日下一節改其作也。晏此先客於脊背也。每至

於風府則腰理開。腰理開則邪氣入。邪氣入則病作。

以此日作稍益也。其出於風府日下一節二十五日下

至骶骨。二十六日入於脊內。注於伏膂之脈。其氣上行九日

出於缺盆之中。其氣日高。故作日益早也。其間日發者

由邪氣內薄。初五藏橫連。募原也。其道遠。其氣深

其行遲。不能與衛氣俱行。不得皆出。故間日及作也。

帝曰。夫子言衛氣每至風府。腰理及發。發則邪氣入

入則病作。今衛氣日下一節。其氣之發也。不當風府

其日作者奈何。岐伯曰。此邪氣客於頭項。循脊而下者也。

邪氣

邪氣

三十五

三

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

但たん
ひたす
弾消録
腫肉

Ⅶ

病勢の衰
かた利すの
病態と脈と
一致し方

皮膚之中、秋傷於風則病成矣。夫寒者陰氣也、風者陽氣也。先傷於寒而後傷於風、故先寒而後熱也。病以時作、名曰寒瘧。帝曰：寒而後寒者何也？岐伯曰：此皮膚於風而後傷於寒、故皮熱而後寒也。亦以時作、名曰溫瘧。其但熱而不寒者、陰氣先絕、陽氣獨發、則少氣煩冤、手足熱而欲嘔。名曰瘧瘧。

帝曰：大經言有餘者瀉之、不足補之。今熱者有餘、寒者不足。夫瘧者之寒、湯火不能溫也。及其熱、冰水不能寒也。此皆有餘不足之類也。當此之時、良工不能止也。須臾自衰、反刺之、其效何也？願聞其說。岐伯曰：經言

望逆

VIII

陽虛陰勝

寒

陰虛陽勝

熱

此病之極也
必死之病也
此病之極也
必死之病也

無刺熇熇之熱、氣刺渾渾之脈、無刺漉漉之汗、故為
 其病逆、未可治也。天瘧之始發也、陽氣并於陰、當是之時、
 陽虛而陰盛、外無氣、故先寒慄也。陰氣逆極則復
 出之陽、陽與陰復并於外、則陰虛陽實、故先熱而渴。
 夫瘧氣者、并於陽則陽勝、并於陰則陰勝、陰勝則寒、
 陽勝則熱。瘧者、風寒之氣不常也。病極則復、至病之
 發也、如火之熱、如風雨之不可當也。故經言曰、方其盛
 時、必毀、因其衰也、事必大昌、此之謂也。夫瘧之未發也、
 陰未并陽、陽未并陰、因而調之、真氣得安、邪氣及亡、
 故不能治其已發、為其氣逆也。

脈と病勢と反する！
 VII

望
 無利病與脈相逆者

區

治瘧法

刺絡

區

病陽熱
陰寒

衛氣集
於陽

區

邪氣
入於
六腑
則
死

帝曰善。攻之奈何。早晏何如。岐伯曰瘧之且發也。陰陽之

且移也。也從四末始也。陽已傷。陰從之。故先其時。堅束

其處。令邪氣不得入。陰氣不得出。審候見之。在頰絡

盛堅而血者。皆取之。此真往而未得并者也。

帝曰瘧不發。其應何如。岐伯曰瘧氣者。必更盛更虛。

當氣之所在也。病在陽則熱而脈躁。在陰則寒而

脈靜。極則陰陽俱衰。衛氣相離。故病得休。衛氣

集則復病也。

帝曰時有間。二日或至數日發。或過或不遇。其故何也。

岐伯曰其間日者。邪氣與衛氣客於六府。而有時相失。

相失

瘧疾の病

夏に暑に傷み、
或は定む、或は不定

XII

生後通天論
夏暑傷秋
為秋瘧

陰陽家
夏暑傷秋
以秋瘧

不能相得、或休數日及作也。

瘧者陰陽更勝也。或甚

或不甚、或渴或不渴。

瘧、定形は夏暑に傷みたる上、
秋に風邪に入ることあり

帝曰、論言夏傷於暑、秋也病瘧。今瘧不必應者、何也。

岐伯曰、此應四時者也。其病異形者、反四時也。其以秋

病者、寒甚。以冬病者、寒不甚。以春病者、惡風。以夏病者

多汗。

XIII

帝曰、夫病溫瘧、與寒瘧而皆安舍、舍於何藏。

岐伯曰、溫瘧者、得之冬中、於風寒、氣藏於骨髓之中。至春則

陽氣大發、邪氣不能自出、因遇大暑、腦髓燄、肌肉消

衰、理發泄、或有所用力、邪氣與汗皆出、此病藏於腎。

溫瘧の
病理機

XIII

痺瘧の
病理機序

及反
太中

其氣先從内出之於外也。如是者陰虛陽盛、陽盛則熱矣。
衰則氣復反入、入則陽虛、陽虛則寒矣。故先熱而
後寒、名曰溫瘧。

帝曰：痺瘧何如？岐伯曰：痺瘧者、有熱、氣盛於身、厥逆

上衝、中氣實而不外泄、因有所腠理開、風寒舍於皮膚

之内、分肉之間而發。發則陽氣盛、陽氣盛而不衰、則

病矣。其氣不及於陰、故但熱而不寒。氣內藏於心、而

外舍於分肉之間。令人消燄脫肉、故命曰痺瘧。

帝曰：善。

瘧疾論

官衛生會

瘧疾論